











MONITOR DE SÍNTOMAS

Este monitor de síntomas interactivo puede ayudarlo a realizar un seguimiento de sus síntomas. Puede completarlo y enviárselo por correo electrónico a su médico, o imprimir algunas hojas y completarlas a mano para llevarlas a su próxima cita con el médico. Si observa algunos cambios en su salud, infórmele a su médico de inmediato.

FECHA: ____ / ____ / ____ **Registre sus síntomas todos los días**

 PESO	<p>Pésese todas las mañanas a la misma hora. <i>Si nota que ha aumentado 3 libras o más en 1 día, llame a su médico de inmediato.</i></p> <p style="text-align: right;">_____ LB</p>				
 CANSANCIO	NINGUNO	MEJOR	IGUAL	PEOR	NUEVO
 HINCHAZÓN	NINGUNO	MEJOR	IGUAL	PEOR	NUEVO
 TOS	NINGUNO	MEJOR	IGUAL	PEOR	NUEVO
 FALTA DE AIRE	NINGUNO	MEJOR	IGUAL	PEOR	NUEVO

FECHA: ____ **Registre sus síntomas todos los días**






 PESO	<p>Pésese todas las mañanas a la misma hora. <i>Si nota que ha aumentado 3 libras o más en 1 día, llame a su médico de inmediato.</i></p> <p style="text-align: right;">_____ LB</p>				
 CANSANCIO	NINGUNO	MEJOR	IGUAL	PEOR	NUEVO
 HINCHAZÓN	NINGUNO	MEJOR	IGUAL	PEOR	NUEVO
 TOS	NINGUNO	MEJOR	IGUAL	PEOR	NUEVO
 FALTA DE AIRE	NINGUNO	MEJOR	IGUAL	PEOR	NUEVO

Puede llenarlo y llevárselo a su médico en la próxima cita, junto con la Guía de diálogo con su médico, que puede descargarla en www.ENTRESTO.com/drguide. Consulte los Datos importantes acerca de ENTRESTO en la última página.

MONITOR DE SÍNTOMAS

Este monitor de síntomas interactivo puede ayudarlo a realizar un seguimiento de sus síntomas. Puede completarlo y enviárselo por correo electrónico a su médico, o imprimir algunas hojas y completarlas a mano para llevarlas a su próxima cita con el médico. Si observa algunos cambios en su salud, infórmele a su médico de inmediato.

FECHA: ____ / ____ / ____ **Registre sus síntomas todos los días**

 PESO	<p>Pésese todas las mañanas a la misma hora. <i>Si nota que ha aumentado 3 libras o más en 1 día, llame a su médico de inmediato.</i></p> <p style="text-align: right;">_____ LB</p>				
 CANSANCIO	NINGUNO	MEJOR	IGUAL	PEOR	NUEVO
 HINCHAZÓN	NINGUNO	MEJOR	IGUAL	PEOR	NUEVO
 TOS	NINGUNO	MEJOR	IGUAL	PEOR	NUEVO
 FALTA DE AIRE	NINGUNO	MEJOR	IGUAL	PEOR	NUEVO

FECHA: ____ **Registre sus síntomas todos los días**

 PESO	<p>Pésese todas las mañanas a la misma hora. <i>Si nota que ha aumentado 3 libras o más en 1 día, llame a su médico de inmediato.</i></p> <p style="text-align: right;">_____ LB</p>				
 CANSANCIO	NINGUNO	MEJOR	IGUAL	PEOR	NUEVO
 HINCHAZÓN	NINGUNO	MEJOR	IGUAL	PEOR	NUEVO
 TOS	NINGUNO	MEJOR	IGUAL	PEOR	NUEVO
 FALTA DE AIRE	NINGUNO	MEJOR	IGUAL	PEOR	NUEVO

Puede llenarlo y llevárselo a su médico en la próxima cita, junto con la Guía de diálogo con su médico, que puede descargarla en www.ENTRESTO.com/drguide. Consulte los Datos importantes acerca de ENTRESTO en la última página.

INFORMACIÓN IMPORTANTE ACERCA DE ENTRESTO®

¿Cuál es la información más importante que debo saber sobre ENTRESTO?

ENTRESTO puede dañar o causar la muerte a su bebé en gestación. Hable con su médico acerca de otras formas de tratar la insuficiencia cardíaca si planea quedar embarazada. Informe a su médico de inmediato, si queda embarazada durante el tratamiento con ENTRESTO.

¿QUÉ ES ENTRESTO?

ENTRESTO es un medicamento de venta con receta que se usa para tratar a adultos con insuficiencia cardíaca duradera (crónica) para ayudar a reducir el riesgo de muerte y hospitalización. ENTRESTO funciona mejor cuando el corazón no puede bombear una cantidad normal de sangre al cuerpo. También se usa para tratar a ciertos niños de 1 año de edad o más que tienen insuficiencia cardíaca sintomática. Se desconoce si ENTRESTO es seguro y eficaz en niños menores de 1 año de edad.

No tome ENTRESTO si:

- es alérgico a cualquiera de los ingredientes de ENTRESTO.
- ha tenido una reacción alérgica, como hinchazón de la cara, los labios, la lengua o la garganta (angioedema) o dificultad para respirar mientras tomaba un tipo de medicamento llamado inhibidor de la enzima convertidora de la angiotensina (ECA) o bloqueador del receptor de la angiotensina II (BRA).
- toma un medicamento inhibidor de la ECA. **No tome ENTRESTO durante al menos 36 horas antes o después de tomar un medicamento inhibidor de la ECA.** Consulte a su médico o farmacéutico antes de tomar ENTRESTO si no está seguro de si toma un medicamento inhibidor de la ECA.
- tiene diabetes y toma un medicamento que contiene aliskiren.

Antes de tomar ENTRESTO, informe a su médico todas sus afecciones, incluso si:

- tiene antecedentes de angioedema hereditario.
- tiene problemas renales o hepáticos.
- tiene diabetes.
- está embarazada o planea quedar embarazada. Consulte “¿Cuál es la información más importante acerca de ENTRESTO que debo conocer?”.
- está amamantando o planea amamantar. Se desconoce si ENTRESTO pasa a la leche materna. No debe amamantar durante el tratamiento con ENTRESTO. Usted y su médico deben decidir si tomará ENTRESTO o amamantará.

Infórmele al médico acerca de todos los medicamentos que recibe, incluidos los de venta con receta y de venta libre, las vitaminas y los suplementos a base de hierbas. El uso de ENTRESTO con otros medicamentos determinados puede hacer que estos se afecten entre sí. El uso de ENTRESTO con otros medicamentos puede causar efectos secundarios graves. Informe especialmente a su médico si toma suplementos de potasio o sustitutos de sal, fármacos antiinflamatorios no esteroides (AINE), litio u otros medicamentos para la presión arterial alta o problemas cardíacos, como los inhibidores de la ECA, BRA o aliskiren. Haga una lista de sus medicamentos para mostrárselas al médico y al farmacéutico cuando le den un nuevo medicamento.

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de ENTRESTO? ENTRESTO podría causar efectos secundarios graves, entre ellos:

- Consulte “¿Cuál es la información más importante acerca de ENTRESTO que debo conocer?”.
- **Reacciones alérgicas graves que causan hinchazón del rostro, los labios, la lengua y la garganta (angioedema), que pueden provocar problemas para respirar y la muerte.** Solicite asistencia médica de emergencia inmediatamente si tiene síntomas de angioedema o dificultad para respirar. No vuelva a tomar ENTRESTO si ha tenido angioedema durante el tratamiento con ENTRESTO.
- Las personas de raza negra que toman ENTRESTO pueden tener un mayor riesgo de tener angioedema que las personas que no son de raza negra y toman ENTRESTO.
- Las personas que han tenido angioedema antes de tomar ENTRESTO pueden tener un mayor riesgo de tener angioedema que las personas que no han tenido angioedema antes de tomar ENTRESTO. Consulte “No tome ENTRESTO si:”
- **Presión arterial baja (hipotensión).** La presión arterial baja es frecuente durante el tratamiento con ENTRESTO. El riesgo de tener presión arterial baja es mayor si también toma píldoras de agua (diuréticos). Llame a su médico si se mareo o tiene aturdimientos, o si desarrolla fatiga extrema.
- **Problemas renales.** Los problemas renales son frecuentes durante el tratamiento con ENTRESTO y pueden ser graves y provocar insuficiencia renal. El médico controlará su función renal durante el tratamiento con ENTRESTO.
- **Aumento de la cantidad de potasio en la sangre (hiperpotasemia).** El aumento de los niveles de potasio en sangre es frecuente durante el tratamiento con ENTRESTO. El médico le controlará el nivel de potasio en sangre durante el tratamiento con ENTRESTO.

Los efectos secundarios más frecuentes también incluyen tos y mareos.

Es posible que su médico tenga que reducir su dosis o interrumpir temporal o permanentemente el tratamiento si desarrolla ciertos efectos secundarios o si tiene cambios en su función renal o aumento de los niveles de potasio en sangre durante el tratamiento con ENTRESTO.

Estos no son todos los posibles efectos secundarios de ENTRESTO. Llame a su médico para obtener asesoramiento médico sobre los efectos secundarios.

Se aconseja que se informe a la FDA de los efectos secundarios negativos de los medicamentos recetados. Visite www.fda.gov/medwatch o llame al 1-800-FDA-1088.

Esta información no es exhaustiva. Para obtener más información, consulte a su proveedor de atención médica o farmacéutico, visite www.entresto.com para consultar la etiqueta del producto aprobada por la Administración de Alimentos y Medicamentos (Food and Drug Administration, FDA) o llame al 1-888-ENTRESTO.

